

Geometrie der Zahlen - zum 150. Geburtstag von Hermann Minkowski

Yuri Tschinkel

1 CV

1.1 Familie

Hermann Minkowski wurde vor 150 Jahren, am 22. Juni 1864 geboren. Er entstammte einer jüdischen Familie, mit Wurzeln in Osteuropa. Einer seiner Vorfahren war Baruch ben Jakob aus Shklov, ein Richter in Minsk, mit Neigung zur Medizin. Nach umfangreichen Reisen durch England, Holland und Deutschland, kehrte er nach Weißrussland zurück und starb dort in Sluzk im Jahr 1812. Er übersetzte die ersten 6 Bände von Euklid aus dem Griechischen ins Hebräische, in der Hoffnung, diesen klassischen Text zugänglicher zu machen. Sein Enkel, Isaak ben Aaron, nahm den Namen Minkowski an. Er lebte in einer kleinen Stadt Karlin (Pinsk), die zuerst Polnisch, dann Schwedisch, dann Russisch war, und gegenwärtig in Weißrussland liegt. Isaaks Enkel, Levin (1825-1884), Weizenhändler in Vilna, heiratete Rahel, Tochter eines Weizenhändlers. Sie lebten in Alexotas (Polnisch-Litauisch, Preussisch, Polnisch, und Russisch) und hatten 5 Kinder: Max, Oscar, Fanny, Hermann, Toby. Um dem wachsenden Antisemitismus im zaristischen Russland zu entkommen, übersiedelte die Familie nach Königsberg und wurde 1872 in Preussen naturalisiert.

Minkowski wurde dort auf das *Altstädtische Gymnasium* aufgenommen, an dem er mit 15 Jahren sein Abitur ablegte. Dieses Gymnasium existierte schon im 16. Jahrhundert und war eine Art Ostpreussische "Spezialschule": es publizierte eigene Berichte und hatte u.a. das Crellsche Journal für die Reine und Angewandte Mathematik in der Schulbibliothek (was heute sogar für Mathematikinstitute keine Selbstverständlichkeit ist).

1.2 Stationen seines Lebens

Nach Studien an den Universitäten Königsberg und Berlin, Promotion in Königsberg 1885, nach dem Armeedienst,¹ Anstellungen an den Universitäten Bonn und Königsberg, wurde Minkowski 1896 auf eine Ordentliche Professur am Eidgenössischen Polytechnikum Zürich (ETH) berufen. Von 1902 bis 1909 war er Professor in

¹ *Gebräunt wie ein Kameruner, und munter wie ein Fisch in seinem Element, hoffe ich, dass der Rest meiner Dienstzeit nur leichte vergnügte Stunden bringen wird. Vielleicht bietet sich dann auch Gelegenheit, eine alte Bekanntschaft mit Frau Mathematika zu erneuern. [9, S. 32]*

Göttingen, wo er am 12. Januar 1909, im Alter von 44 Jahren, an einer Blinddarmentzündung verstarb.

Eine kurze Mitteilung darüber erschien im Jahresbericht der DMV:

Mathematische Gesellschaft in Göttingen. Neunte Sitzung am 12. Januar 1909: Nach Mitteilung des am Mittag plötzlich erfolgten Todes von Prof. Minkowski wird die Sitzung aufgehoben. — **Zehnte Sitzung am**

Es folgen Zeilen aus dem ergreifenden Nachruf von Hilbert²:

Mehr als sechs Jahre hindurch haben wir, seine nächsten mathematischen Kollegen, jeden Donnerstag pünktlich drei Uhr mit ihm zusammen einen mathematischen Spaziergang auf den Hainberg gemacht – auch den letzten Donnerstag vor seinem Tode, wo er uns mit besonderer Lebhaftigkeit von den neuen Fortschritten seiner elektrodynamischen Untersuchungen erzählte: den Donnerstag darauf – wiederum um drei Uhr – gaben wir ihm das letzte Geleit.

Die Grabstätte von Minkowski und seinem Bruder Oskar (Arzt und Wissenschaftler, entdeckte den Zusammenhang zwischen Bauchspeicheldrüse und Diabetes) befindet sich auf dem Waldfriedhof Heerstrasse in Berlin-Charlottenburg. Bis 2014 war es eine Ehrengrabstätte der Stadt Berlin, zu erkennen am roten Ziegelstein unten links.



²Nachr. der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 1909

Trotz intensiver Bemühungen der Berliner Mathematiker, hat das Land Berlin im Juli 2014 die Anerkennung der Grabstätte der Brüder Minkowski nicht verlängert:

Unter diesen Prämissen war die für Sie – und andere – überraschende Entscheidung einer Nichtverlängerung, wie in anderen vergleichbaren Fällen, folgerichtig, denn bezüglich der hochverdienten Brüder Minkowski war eine solche Popularität, wie sie die Anerkennungskriterien unabdingbar verlangen, leider nicht feststellbar.³

2 Wissenschaftliche Laufbahn

2.1 Quadratische Formen

Im Jahr 1882 formulierte die Pariser Académie als Preisaufgabe, das von *Ferdinand Gotthold Max Eisenstein* 1847 im *Crellschen Journal* gestellte Problem zu lösen:

17.
Note sur la représentation d'un nombre par la somme de cinq carrés.

(Par Mr. G. Eisenstein.)

Mr. Dirichlet, à la fin de son beau mémoire sur les formes quadratiques^{*}), à remarqué que par la combinaison de deux théories, dont on doit l'une à lui-même, l'autre à Mr. *Gauß*, on peut trouver des expressions très-simples et très-remarquables du nombre des représentations d'un entier donné par la somme de trois carrés. J'ai trouvé qu'il existe des formules absolument semblables pour le

Es ging um die Anzahl der Darstellungen einer natürlichen Zahl als Summe von fünf Quadratzahlen, also um ganzzahlige Lösungen der Gleichung

$$m = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + x_5^2, \quad m \in \mathbb{N}.$$

Minkowski erhielt die Auszeichnung der Académie und wurde über Nacht international berühmt. Es gab allerdings gewisse sonderbare Umstände, die die Entscheidung der Académie begleiteten: die Académie hat übersehen, dass ein führender englischer Mathematiker, Henry John Steven Smith⁴ das Problem schon 1868 in den *Proceedings of the Royal Society of London* behandelt hatte. Smith was nicht wenig erstaunt⁵, dass seine Arbeit bei den französischen Mathematikern ohne Beachtung blieb, und beschwerte sich bei Hermite. Hermite versicherte, dass die *Verlegenheit* ganz bei der Académie-Kommission liege, und dass es nur eines Manuscripts von Smith bedürfte, um die *Verlegenheit* aus der Welt zu räumen. Am Ende wurde das Preisgeld zwischen Minkowski und dem bis dahin verstorbenen Smith geteilt.

³Einen Monat nach diesem Brief aus seiner Kanzlei trat der Bürgermeister von Berlin vom Amt zurück.

⁴He was a tall, good-looking man, renowned for his charm, generosity, warmth, and spontaneous wit ...[11]


⁵*somewhat troubled and a little annoyed*

Der Wettbewerb mit französischer Mathematik blieb allgegenwärtig:

Minkowski ist es zu danken, daß nach Hermites Tode die Führerrolle in der Zahlentheorie wieder in deutsche Hände zurückfiel, und wenn man überhaupt bei einer solchen Wissenschaft, wie es die Arithmetik ist, die Beteiligung der Nationen an den Fortschritten und Errungenschaften abwägen will: wesentlich durch Minkowskis Wirken ist es gekommen, daß heute im Reiche der Zahlen die bedingungslose und unbestrittene deutsche Vorherrschaft statthat.⁶

2.2 Bonn

Trotz des frühen Erfolgs war die Beförderung zum Ordentlichen Professor nicht automatisch. Der Briefwechsel mit Hilbert verrät Nervosität. Insbesondere war Minkowski von Bonn nicht sehr begeistert [9, S. 54]:⁷



Der Umgang hier mit meinen mathematischen Kollegen ist wirklich bejammernswert; der eine klagt über Migräne, so wie man a oder x sagt; bei dem

Auch die Rückkehr nach Königsberg und Ernennung zum Ordentlichen Professor im Jahr 1895 lässt ihn rastlos. So wird ein Ruf nach Zürich zu einer großen Freude:

In Zürich selbst ist es, wie Du Dir denken kannst, wunderschön. [9, S. 85]

Die komplizierten Verhandlungen sind erfolgreich, und seine neuen Vorgesetzten voll des Lobes:

Die Vielseitigkeit seines Wissens geht auch aus der Liste der bis jetzt von ihm in Bonn und Königsberg gehaltenen Vorlesungen hervor, die fast den ganzen Umfang der heutigen mathematischen Forschung und ihrer Anwendungen auf Mechanik und Physik berühren. Ich will nicht versäumen hervorzuheben, daß der Eindruck, den der erst 32-jährige Mann auch außerhalb seiner Wissenschaft macht, ein ganz bedeutender und sehr sympatischer ist. (Brief an den Bundesrat, September 1896, siehe [12].)

Die frühe Begeisterung für Zürich leidet an den Realitäten des Alltags. Minkowski klagt über das schwache Niveau der Studenten (unter seinen Studenten war auch Einstein):

Schliesslich komme ich noch gar in den Ruf eines schwierigen Docenten, und dann sind von vornherein die Meldungen zu

⁶Hilbert: Nachruf auf Minkowski

⁷*Der Umgang hier mit meinen mathematischen Kollegen ist wirklich bejammernswert; der eine klagt über Migräne, so wie man a oder x sagt; bei dem anderen tritt innerhalb von fünf Minuten die Frau dazwischen, um dem Gespräch eine andere Wendung zu geben.*

den Vorlesungen wenig zahlreich. Ich werde in der Popularisierung des Stoffs bis an die äusserst mögliche Grenze gehen müssen; denn diejenigen, die mich vielleicht um wissenschaftlicher Leistungen wegen genommen haben, wollen schliesslich für ihr Geld auch etwas haben. So sehe ich ziemlich traurig in die weiteren Semester, viel solche Arbeit, die mir im Grunde wenig zu Gute kommt, anders, als ich mir die Sachlage bei Annahme des Rufes ausgemalt habe. [9, S. 94]

Aber auch mit Kollegen scheint es Kontaktschwierigkeiten zu geben:

Auch die eigentlichen Mathematiker, deren Zahl aber sehr gering ist, sind durch alle Collegien, die sie sonst hören müssen, so in Anspruch genommen, dass sie nur geniessen können, was ihnen zerschnitten und zerlegt nach gewaltsamer Öffnung des Mundes eingetrichtert wird.


gesteht nach gewaltsamer Öffnung des Mundes
angebracht wird. Hurwitz selbst hat hierbei

Die Kollegen delegieren Minkowski in das Vergnügungskomitee des ersten Internationalen Mathematikerkongresses in Zürich.


3 Moderne Zeiten

3.1 Geometrie der Zahlen

Die von Minkowski begründete "Geometrie der Zahlen" ist auch heute ein sehr aktives Forschungsgebiet und kann als Vorreiter der "Arakelov-Geometrie" betrachtet werden.



Es geht dabei um Wechselwirkungen zwischen starren Objekten, wie Gittern oder ganzzahligen Lösungen diophantischer Gleichungen, und "weicher" Geometrie; um Beziehungen zwischen Fläche, Volumen, Krümmung, und Gitterpunkten.



Vorlesungsmitschrift, Göttingen

Ein Hauptsatz der *Geometrie der Zahlen* lautet wie folgt:

Sei $\Lambda \subset \mathbb{R}^2$ ein Gitter mit Fundamentargebiet der Fläche 1. Sei $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^2$ ein konvexes, zentral-symmetrisches Gebiet der Fläche > 4 . Dann enthält \mathcal{D} mindestens zwei Gitterpunkte.

Dieser Satz hat viele Anwendungen und Verallgemeinerungen, zum Beispiel, in algebraischer Zahlentheorie. Dort untersucht man Ringe ganzer Zahlen in endlichen Erweiterungen K von \mathbb{Q} . Eine wichtige Invariante ist die Diskriminante des Ringes; wenn der Ring $\mathcal{O}_K \subset K$ als $\mathbb{Z}[\alpha]$ gegeben werden kann, wo α eine ganze algebraische Zahl ist, ist die Diskriminante

$$d(K) := \prod_{i < j} (\alpha_i - \alpha_j)^2,$$

wobei $\{\alpha_i\}$ die Menge der Wurzeln des Minimalpolynoms von α ist.

Es wird vermutet, dass die Anzahl der Körper mit beschränkter Diskriminante linear wächst:


$$\#\{[K : \mathbb{Q}] = d \mid |d(K)| \leq B\} \sim C_d \cdot B, \quad B \rightarrow \infty.$$

Diese Behauptung ist trivial für $d = 2$, ein klassisches Theorem für $d = 3$ (Davenport-Heilbronn, 1971) und eine brillante Anwendung der *Geometrie der Zahlen* für $d = 4, 5$ (Bhargava, 2001). Für $d > 5$ hat man z.Z. nur eine Abschätzung:

$$\ll B^{\exp(C\sqrt{\log d})} \quad (\text{Ellenberg-Venkatesh, 2006}).$$

3.2 Polyeder

Minkowski interessierte sich auch für "starre Gebilde" – Polyeder.



Klein Protokolle, Göttingen

Hier sind einige moderne Probleme zu diesem Thema. Gegeben sei ein Gitter $\Lambda \subset \mathbb{R}^d$ und ein Polyeder Π mit Ecken in Λ . Gesucht ist die Anzahl $\psi(n)$ der Gitterpunkte in $n \cdot \Pi \cap \Lambda$, für $n \rightarrow \infty$. Die Lösung appelliert an die Theorie der *torischen* Varietäten; diese werden durch monomiale Gleichungen beschrieben. Aus (Π, Λ) konstruiert man eine torische Varietät $X_{\Pi, \Lambda}$ und ein *Geradenbündel* L , so dass

$$\psi(n) = \dim H^0(X_{\Pi, \Lambda}, nL),$$

die Dimension des Raumes der globalen Schnitte von nL ist. Dann gibt der Satz von Riemann-Roch eine Formel für $\psi(n)$, die ausschließlich von *topologischen* Invarianten von $X_{\Pi, \Lambda}$ abhängt.

Eine andere kombinatorische Aufgabe in diesem Zusammenhang ist die Untersuchung des f -Vektors


$$f = f(\Pi) = (f_0(\Pi), f_1(\Pi), \dots, f_d(\Pi)),$$

wobei $f_j(\Pi)$ die Anzahl der j -dimensionalen Seiten von Π ist. Auch hier ist der Übergang zu torischen Varietäten von entscheidender Bedeutung: die *Intersection cohomology* torischer Varietäten kodiert interessante Beziehungen zwischen den $f_j(\Pi)$.

Weitere Anwendungen von Polyedern finden sich in der Theorie der hypergeometrischen Funktionen, Darstellungstheorie, in reeller, symplektischer, und *tropischer* Geometrie (Okounkov bodies), in der algebraischen Geometrie bei der Auflösung von Singularitäten, Faktorisierung von birationalen Morphismen, Klassifikationsfragen, im Programm der Minimalen Modelle (Kegel der ample und effektiven Divisoren).

3.3 Kugelpackungen

Minkowski beschäftigte sich mit dem Problem der "Dichtesten gitterförmigen Lagerung kongruenter Körper", einer Verallgemeinerung der Keplerschen Vermutung.



Felix Klein Protokolle, Göttingen

Die Keplersche Vermutung wurde 1998 von Sam Ferguson und Tom Hales bewiesen. Allerdings stützte sich der Beweis auf massive Computerrechnungen, die von den Gutachtern der Arbeit nicht im Detail nachvollzogen werden konnten. Erst in diesem Jahr gelang Hales der formale Nachweis der Korrektheit des Beweises.⁸

Über dichteste Packungen mit anderen Körpern, wie Tetraedern, ist wenig bekannt.

3.4 Das Hasse-Minkowski Prinzip

Diese Prinzip besagt, dass eine quadratische Form $f \in \mathbb{Q}[x_0, \dots, x_n]$, die nicht-triviale Nullstellen in \mathbb{R} and allen p -adischen Körpern \mathbb{Q}_p hat, auch nicht-triviale Nullstellen in \mathbb{Q} besitzt. Diese Eigenschaft gilt nicht mehr für Formen höheren Grades, z.B. für die Form $3x_0^3 + 4x_1^3 + 5x_2^3$.

Eine bemerkenswerte Errungenschaft von M. Bhargava (Fields-Medaille 2014) ist der Beweis, basierend auf der *Geometrie der Zahlen*, dass ein positiver Anteil der kubischen Formen in drei Variablen dem Hasse-Minkowski Prinzip genügt, und ein positiver Anteil der Formen Gegenbeispiele zu diesem Prinzip liefert [3].

Auch in höheren Dimensionen gibt es Gegenbeispiele. So hat z.B. die Gleichung

$$x^2 + x_1^2 = f(t)x_2^2, \quad f(t) = (t^2 - 2)(3 - t^2) \quad (1)$$

keine nicht-trivialen Lösungen in \mathbb{Q} . Dieses wird mit höheren, so-geannten kohomologischen, Brauer-Manin Obstruktionen gezeigt. Ein wirklicher Durchbruch gelang in [6]: für viele konische Bündel, wie (1), folgt aus dem Verschwinden der Brauer-Manin Obstruktion die Existenz von nicht-trivialen rationalen Lösungen. Der Beweis basiert auf Lehrsätzen in additiver Kombinatorik aus der Doktorarbeit von L. Matthiesen, die wiederum aus der Theorie von B. Green und T. Tao folgen.

3.5 Flugzeuge

Um 1905 versuchte Minkowski, eine mathematische Erklärung für das Interferenzexperiment von Michelson zu

⁸Projekt Flyspeck <https://code.google.com/p/flyspeck/>.

finden, und war sehr überrascht, dass sein Student Einstein schon eine Arbeit darüber publiziert hatte [5], [7]. Einsteinsche Behandlung des Themas basierte auf physikalischen Prinzipien, und die mathematischen Grundlagen fehlten. Minkowski, und unabhängig, Poincare, formulierten diese Grundlagen, die sich als von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung der modernen Physik erwiesen. Die Hauptidee war die Einführung der 4-dimensionalen Raum-Zeit Koordinaten. Minkowskis berühmter Vortrag auf der Naturforscherversammlung in Köln, 1908, beginnt mit den Worten:

Dieser Dankbarkeit Ausdruck zu geben, fordere ich Sie, meine verehrten Kollegen und meine lieben Kommilitonen, auf, mit mir einzustimmen in den Ruf:

Seine Königliche Hoheit Großherzog Friedrich
Hoch! Hoch! Hoch!

Raum und Zeit¹⁾.

Von HERMANN MINKOWSKI in Göttingen.

M. H.! Die Anschauungen über Raum und Zeit, die ich Ihnen entwickeln möchte, sind auf experimentell-physikalischem Boden erwachsen. Darin liegt ihre Stärke. Ihre Tendenz ist eine radikale. Von Stund' an sollen Raum für sich und Zeit für sich völlig zu Schatten herabsinken und nur noch eine Art Union der beiden soll Selbständigkeit bewahren.

In diesem Vortrag erklärt Minkowski die Grundbegriffe der Lorentz-Geometrie ein und beschreibt den "Minkowski-Raum", als Pendant des euklidischen Raumes. Nach Pythagoras, werden im gewöhnlichen euklidischen Raum die Abstände mit der Metrik

$$ds = \sqrt{dx_1^2 + dx_2^2 + \dots + dx_3^2}$$

gemessen, und der Abstand ist das Integral $\int ds$. In der Beschreibung von Minkowski ist die quadratische Form durch

$$d\tau = \sqrt{c^2 dt^2 - dx_1^2 - \dots - dx_3^2}$$

gegeben, wobei t als Zeitkoordinate verstanden wird, und c die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes im leeren Raume ist. Und das ist genau die quadratische Form, die Minkowski als 18-jähriger untersuchte, als er ganze und rationale Lösungen der Gleichung

$$c = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2, \quad c \in \mathbb{N},$$

verstehen wollte!

Die Bewegung eines Teilchens im Minkowski-Raum wird durch eine Kurve beschrieben, deren Länge durch das Integral $\int d\tau$ gegeben wird. Damit diese Länge nichtnegativ ist, muss das Teilchen langsamer als die Lichtgeschwindigkeit sein, also muss die Kurve im Inneren des "Lichtkegels" liegen. Der Ansatz von Minkowski erklärte die äusserst phantastische Hypothese der Längenverkürzung in Richtung der Bewegung und andere Phänomene der Einsteinschen Relativitätstheorie. Den Einwänden von

Physikern vorbeugend (Einstein: *überflüssige Gelehrsamkeit*), schrieb Minkowski: *Über den Begriff des Raumes in entsprechender Weise hinwegzuschreiten, ist auch wohl nur als Verwegenheit mathematischer Kultur einzutaxieren*. Als eine weitere Provokation an die Physiker könnte man auch die Einführung des *Postulats der absoluten Welt* (oder kurz Weltpostulats) einstufen.

Eine etwas überraschende Anwendung des Minkowski-Raumes ist die Analyse des Flugzeug Boarding Problems [2, 1]. Passagiere werden als Punkte in der Ebene mit Koordinaten q, r dargestellt, wobei q die Position des Passagiers in der Schlange repräsentiert und r die Sitzreihe. Wir können annehmen, dass q und r so normiert sind, dass ihre Werte im Einheitsquadrat liegen. Ein wichtiger Parameter ist die Staukonstante k , definiert als Quotient der Anzahl der Passagiere pro Reihe dividiert durch den Abstand zwischen aufeinander folgenden Reihen. Im einfachsten Fall, wenn es keine von der Fluggesellschaft vorgeschriebenen Einstiegsrichtlinien gibt, also wenn q und r voneinander unabhängig sind, können wir die "eigentliche Zeit" als

$$d\tilde{\tau} = \sqrt{dqdr + k(1-r)dq^2}$$

definieren. In diesem Model ist die Einstiegszeit, als Funktion der Staukonstante k , proportional zur maximalen Länge einer Kurve im Einheitsquadrat bezüglich $d\tilde{\tau}$. Es stellt sich heraus, dass es eine Koordinatentransformation gibt, die von k abhängt, und die $d\tilde{\tau}$ in das $d\tau$ von Minkowski, und die Einstiegszeit in die maximale *Eigenzeit* überführt. Diese Größen können unter variierenden Boardingszenarien berechnet werden; und diese Berechnungen reduzieren sich in vielen Fällen auf die Analyse verschiedener Aspekte des Minkowski-Raumes.

Und hier ist eine andere Anwendung: in [4] wird ein Algorithmus vorgestellt, der es erlaubt, auf Flash-Speicher schneller zuzugreifen. Die Methode basiert, im Wesentlichen, auf der Geometrie konzentrischer "Kreise" im Minkowski-Raum.

4

Beim Lesen der Arbeiten und Briefe von Minkowski fällt auf, wie leicht, spielerisch, und fast verträumt er mit Mathematik umgeht. Seine Ideen sind anschaulich und "wirklichkeitsnah", aber gleichzeitig auch sehr weittragend. Er fühlte es: von seiner Festrede auf Dirichlet [8] hat man den Eindruck, dass er über sich selbst spricht:

Unablässig war sein Sinnen darauf gerichtet, zwischen getrennt bestehenden Gedankensphären die Brücke zu schlagen und unabhängig gezeitigte Erfolge zu fruchtbarer Wechselwirkung zu verschmelzen.

Es ist erstaunlich, wie zutreffend seine, halb im Scherz hingeworfenen, Prophezeihungen erscheinen:

Man hört von der Arithmetisierung ALLER mathematischen Wissenszweige sprechen. Manche halten deshalb die Arithmetik nur noch für eine zweckmässige Staatsverfassung, die

sich das ausgedehnte Reich der Mathematik gibt. Ja, zuletzt werden einige in ihr nur noch die hohe Polizei sehen, welche befugt ist, auf alle verbotenen Vorgänge im weitverzweigten Gemeinwesen der Größen und Funktionen zu achten.

Auch heute hört man oft vom allgegenwärtigen Einsatz, aber nicht nur im Reich der Mathematik, einer besonderen Art der Arithmetik, der Cryptographie.

Ich bin für die Zahlentheorie Optimist und hege still die Hoffnung, daß wir vielleicht gar nicht weit von dem Zeitpunkt entfernt sind, wo die unverfälschte Arithmetik gleichfalls in Physik und Chemie Triumphe feiern wird, und sagen wir z.B., wo die wesentlichen Eigenschaften der Materie als mit der Zerlegung der Primzahlen in zwei Quadrate im Zusammenhang stehend erkannt werden. An jenem Tage werden den Arithmetikern von allen Seiten Huldigungen dargebracht werden.

Auch aus heutiger Sicht ist dieser Optimismus durchaus berechtigt. Erlaubt man die Auffassung, dass der Minkowski-Raum, als Idee, etwas mit Zerlegung von Zahlen in drei Quadrate zu tun hatte, so würde es durchaus in Ordnung sein, die (noch ausstehenden) Huldigungen seitens der Fluggesellschaften und der Flash-Speicher Hersteller an die Arithmetik weiterzuleiten. Was die Zerlegung von Primzahlen in zwei Quadrate angeht, so hat das etwas mit quadratischer Reziprozität zu tun, und die geometrische Version einer weitreichenden Verallgemeinerung der Reziprozität, das Langlands Programm, wird in neuester Zeit auch von Physikern studiert.

Vielleicht wird sich, zuletzt, das Land Berlin noch dazu bewegen lassen, die *Nichtverlängerung* der Anerkennung der Brüder Minkowski zu überdenken.

Literatur

- [1] E. Bachmat, *Mathematical adventures in performance analysis: From Storage Systems, Through Airplane Boarding, to Express Line Queues*, Series: Modeling and Simulation in Science, Engineering and Technology, Birkhäuser, Basel, 2014.
- [2] E. Bachmat, D. Berend, L. Sapir, S. Skiena and N. Stolyarov, *Analysis of airplane boarding via space-time geometry and random matrix theory*, Journal of physics A: mathematical and general, vol. 39, 453-459, 2006.
- [3] M. Bhargava, *A positive proportion of plane cubics fail the Hasse principle*, arXiv: 1402.1131, 2014.
- [4] A. Bhatia, M. Qin, A.R. Iyengar, B.M. Kurkoski, P. Siegel, *Lattice based WOM codes for multilevel flash memories*, IEEE journal on selected areas in communications, vol. 32(5), 933-945, 2014.
- [5] M. Born, *My Life: Recollections of a Nobel Laureate*, Scribner, New York, 1978.
- [6] T. Browning, L. Matthiesen, A. Skorobogatov, *Rational points on pencils of conics and quadrics with many degenerate fibres*, Annals of Math., vol. 180, 381-402, 2014.
- [7] A. Einstein, *Zur Elektrodynamik bewegter Körper*, Annalen der Physik, vol. 17, 891-921, 1905.

- [8] H. Minkowski, *Peter Gustav Lejeune Dirichlet und seine Bedeutung für die heutige Mathematik*, Jahresbericht der DMV, Band 14, 149-163; in *Gesammelte Abhandlungen von Hermann Minkowski*, Chelsea Publishing, New York, 1967.
- [9] L. Rüdberg, H. Zassenhaus, Hrsg., *Briefe von Minkowski an Hilbert*, Springer-Verlag, 1973.
- [10] J.-P. Serre, *Smith, Minkowski et l'Académie des Sciences*, Gaz. Math. No. 56, 39, 1993.
- [11] J. W. L. Glaisher, ed., *The Collected Mathematical Papers of Henry John Stephen Smith*, I, II, New York: AMS Chelsea Publishing, 1965.
- [12] U. Stambach, *Die Berufung von Hermann Minkowski an das Eidgenössische Polytechnikum in Zürich*